


# Leczenie bólu metodą nadtwardówkową [okołooponową]



*Różnorodne obszary znieczulone po podaniu nadtwardówkowym [leków]*

## Co to jest?

Leki są podawane poprzez [cewnik] nadtwardówkowy – miękką rurkę (nazywaną cewnikiem), która wprowadzona jest do Pana/Pani pleców. Znieczulenie nadtwardówkowe wpływa wyłącznie na ściśle określone regiony Pana/Pani ciała. Znieczulenie nadtwardówkowe może zostać wykorzystane podczas zabiegu chirurgicznego i może być kontynuowane w okresie pooperacyjnym bez konieczności wykonywania dodatkowych nakłuć. Udowodniono, iż znieczulenie nadtwardówkowe umożliwia uzyskanie skutecznej kontroli bólu po operacji. Znieczulenie nadtwardówkowe może zmniejszyć częstość występowania powikłań pooperacyjnych i może umożliwić szybszy powrót do zdrowia.

## Jak to działa?

- Anestezjolog wprowadza mały cewnik w Pana/Pani plecy.
- Może być Pan/Pani zmuszona do przyjęcia pozycji siedzącej i lekkiego pochylenia się tak, by igła mogła zostać odpowiednio wprowadzona. By zapobiec bólowi związanemu z wkłuciem stosuje się znieczulenie miejscowe.
- Po wprowadzeniu cewnika na miejsce, podaje się przez cewnik lek przeciwbólowy, bezpośrednio lub z zastosowaniem specjalnej pompy.
- Efekt powinien Pan/Pani czuć już po kilku minutach.
- Dawkę leku można dopasować tak, by Pan/Pani otrzymał/a właściwą dawkę dla odczuwanego bólu.

### PROSIMY PAMIĘTAĆ

*Jeśli czuje Pan/Pani ból pomimo podawanego leku należy zgłosić to personelowi medycznemu. Dopasują oni dawkę lub podadzą dodatkowe leki przeciwbólowe.*